

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

| | | |
|--------|---|-----|
| レジメン名 | 乳癌DTX+Tmab(第2クール以降) | ポート |
| 対象疾患 | 乳癌 | |
| 1コース日数 | 21日 | |
| 対象患者区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院 | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間 | day1 | | | day21 |
|-----|---|---------------------|--------------|----------|-------|---------------|------|--|--|-------|
| 1 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 開始時 | ● | | | |
| 2 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | メイン | プライミングして残破棄 | ● | | | |
| 3 | | 大塚生食注250mL | 1 袋 | 【化療混注】 | メイン | 90分 | ● | | | |
| | 癌 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg | 2回目以降は6mg/kg | 埋込型CVポート | | (2回目以降30分でも可) | | | | |
| | 癌 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg | | | | | | | | |
| | | 大塚蒸留水 20mL | 1 A | 薬剤部にて用量計 | | トラスツズマブ溶解用 | | | | |
| 4 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | メイン | 15分 | ● | | | |
| | | デキサート注射液3. 3mg1mL | 2 A | | | | | | | |
| 5 | | 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 | 【化療混注】 | メイン | 1時間 | ● | | | |
| | 癌 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL | 75 mg/m2 | 埋込型CVポート | | | | | | |
| | 癌 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL | | | | | | | | |
| 6 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | メイン | 全開にてフラッシュ | ● | | | |
| 7 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 終了時 | ● | | | |