

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	ティーンズプラスティーマブ 乳癌TC+Tmab(第1クール)	ポート
対象疾患	乳癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day21
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A							
3		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	1時間	●			
	癌	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL	75 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL		バッグアダプタ装着						
4		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	30分	●			
	癌	注射用エンドキサン500mg	600 mg/m2	埋込型CVポート						
				バッグアダプタ装着						
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	閉鎖式レバーロックに接続	全開にてフラッシュ	●			
				バッグアダプタ装着		配合変化回避のため				
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	閉鎖式レバーロックに接続	15分	●			
		ポラミン注5mg0.5%1mL	1 A	バッグアダプタ装着						
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	閉鎖式レバーロックに接続	全開にてフラッシュ	●			
				バッグアダプタ装着		配合変化回避のため				
8		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	90分	●			
	癌	トラスツマブBS点滴静注用60mg	初回は8mg/kg	埋込型CVポート		(2回目以降30分でも可)				
	癌	トラスツマブBS点滴静注用150mg		バッグアダプタ装着						
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量計		トラスツマブ溶解用				
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	閉鎖式レバーロックに接続	全開にてフラッシュ	●			
				バッグアダプタ装着						
10		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●			