

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	ディーシープラスティーマブ 乳癌TC+Tmab(第2クール以降)	ポート以外
対象疾患	乳癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day21
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A							
2		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	1時間	●			
	癌	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL	75 mg/m2	点滴静注						
	癌	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL		バッグアダプタ装着						
3		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	30分	●			
	癌	注射用エンドキサン500mg	600 mg/m2	点滴静注						
				バッグアダプタ装着						
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	閉鎖式レバーロックに接続	全開にてフラッシュ	●			
				バッグアダプタ装着		配合変化回避のため				
5		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	90分	●			
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用60mg	2回目以降は6mg/kg	点滴静注		(2回目以降30分でも可)				
	癌	トラスツズマブBS点滴静注用150mg		バッグアダプタ装着						
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量計		トラスツズマブ溶解用				
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	閉鎖式レバーロックに接続	全開にてフラッシュ	●			
				バッグアダプタ装着						