

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	nab-PTX+Atezolizumab(アテゾリズマブ)	ポート以外
対象疾患	乳癌	
1コース日数	28日	
対象患者区分	■ 外来	■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day8	day15	day28
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●		●	
2	癌	テセントリク点滴静注840mg	840mg /BODY	【化療混注】 点滴静注 インラインフィルター使用	メイン	1時間 (2回目以降30分でも可)	●		●	
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●		●	
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL デキサート注射液3. 3mg1mL	1 瓶 2 A	点滴静注	側管	15分	●		●	
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		●	
6	癌	生理食塩液「ヒカリ」50mL アブラキサン点滴静注用100mg	1 瓶 100 mg/m2	【化療混注】 点滴静注 インラインフィルター使用禁止 薬剤部にて用量調整 100mg1Vあたり20mLで溶解	側管	30分	●		●	
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●		●	
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL デキサート注射液3. 3mg1mL	1 瓶 2 A	点滴静注	メイン	15分		●		
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 袋	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため		●		
10	癌	生理食塩液「ヒカリ」50mL アブラキサン点滴静注用100mg	1 瓶 100 mg/m2	【化療混注】 点滴静注 インラインフィルター使用禁止 薬剤部にて用量調整 100mg1Vあたり20mLで溶解	メイン	30分		●		
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ		●		