

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	フォルフィリプラスシーマブ 大腸癌FOLFIRI+Cmab 2週毎(ポンプ)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管						
		ボラミン注5mg0.5%1mL	1 管						
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		
4		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●		
	癌	アービタックス注射液100mg 20mL	500 mg/m2	埋込型CVポート		(2回目90分、3回目以降60分でも可)			
				全量250mLに調製					
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●		
		レボホリナート点滴静注用100mg	200 mg/m2			イリノテカンと同時			
		レボホリナート点滴静注用25mg							
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破棄	●		
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	90分	●		
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	150 mg/m2	埋込型CVポート					
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg							
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●		
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●		
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート					
	癌	5-FU注1000mg20mL							
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
12		大塚生食注100mL	薬剤部で用量調節	【化療混注】	ヒューバー針に接続	46時間	●		
	癌	5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	埋込型CVポート	標準型デクスボーズバルブ注入ポンプで				
	癌	5-FU注1000mg20mL							
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●	