

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	フォルフイリプラスシーマブ 大腸癌FOLFIRI+Cmab 1週毎(ポンプ)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rp	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day8	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		●	
2		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg1mL ボラミン注5mg0.5%1mL	1 袋 3 管 1 管	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
4	癌	大塚生食注250mL アービタックス注射液100mg 20mL	1 瓶 初回は400mg/m2 2回目以降は250mg/m2	【化療混注】 埋込型CVポート	メイン	初回は2時間 2回目以降は1時間	●			
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
6		大塚糖液5% 250mL レボホリナート点滴静注用100mg レボホリナート点滴静注用25mg	1 瓶 200 mg/m2	埋込型CVポート	メイン	2時間 イリノテカンと同時	●			
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして換液	●			
8	癌	大塚糖液5% 250mL イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg	1 瓶 150 mg/m2	【化療混注】 埋込型CVポート	側管	90分	●			
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10	癌	大塚生食注100mL 5-FU注250mg5mL 5-FU注1000mg20mL	1 瓶 400 mg/m2	【化療混注】 埋込型CVポート	メイン	10分	●			
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
12	癌	大塚生食注100mL 5-FU注250mg5mL 5-FU注1000mg20mL	薬剤部で用量調節 2400 mg/m2	【化療混注】 埋込型CVポート	ヒューバー針に接続 後継製アムネオ・アムネオ・アムネオ・アムネオ	46時間	●			
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●		
14		大塚生食注100mL デキサート注射液3.3mg1mL ボラミン注5mg0.5%1mL	1 瓶 1 管 1 管	埋込型CVポート	メイン	15分			●	
15		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため			●	
16	癌	大塚生食注250mL アービタックス注射液100mg 20mL	1 瓶 250 mg/m2	【化療混注】 埋込型CVポート	メイン	1時間			●	
17		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ			●	
18		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時			●	