

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	フォルフィリ 大腸癌FOLFIRI(ラクテック持続)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	■ 外来	■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3		day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
3		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用100mg	200 mg/m ²			イリノテカンと同時				
		レボホリナート点滴静注用25mg								
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破棄	●			
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	90分	●			
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	150 mg/m ²	埋込型CVポート						
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg								
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
7		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
癌		5-FU注250mg5mL	400 mg/m ²	埋込型CVポート						
癌		5-FU注1000mg20mL								
8		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●			
癌		5-FU注250mg5mL	2400 mg/m ²	埋込型CVポート						
癌		5-FU注1000mg20mL								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ day3に使用		●		
10		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●		