

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	フォルフィリプラスビーマブ 大腸癌FOLFIRI+Bmab(ポンブ)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	生食注シリンジ「オーツカ」	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3		day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	プライミングして残破棄	●			
3		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●			
	癌	アバスタチン点滴静注用100mg4mL	5 mg/kg	埋込型CVポート		(2回目60分、3回目以降30分でも可)				
	癌	アバスタチン点滴静注用400mg16mL								
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
5		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 袋 3 管	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用100mg	200 mg/m2			イリノテカンと同時				
		レボホリナート点滴静注用25mg								
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破棄	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	90分	●			
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	150 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
12		大塚生食注100mL	薬剤部で用量調節	【化療混注】	ヒューバー針に接続	46時間	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	埋込型CVポート	携帯型ディスプレイボール注入ポンプで					
	癌	5-FU注1000mg20mL								
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●		