がん化学療法レジメン

<u>目次に戻る</u>

The second secon							
	フォルフォックスフォー						
レジメン名	大腸癌FOLFOX4	ポート					
対象疾患	大腸癌						
1コース日数	14日						
対象患者区分	■ 外来 ■	入院					

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	•			
2		アロキシ点滴静注バッグ0. 75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	•			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
3		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	•			
		レボホリナート点滴静注用25mg	100 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg						_		-
_		 生理食塩液「ヒカリ」50mL	, ¥T	埋込型CVポート	Ind Arts	プライミングして残破棄			-	
4		生理長塩液「ビガウ」50mL	1 瓶	理込型CVホート	側管	フライミングして残破業	•		-	
5			1 瓶	【化療混注】	側管	2時間		-		-
	位	大塚稲成5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	1 πL 85 mg/m2	埋込型CVポート		Z 바퀴 [B]	_		+	1
		オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL	OJ IIIg/IIIZ	生色主07/1						
	تترر	1, 1, 1, 2, 2, 2, MANAGET ALKOOTTIS TOTTLE			†			1	+	1
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶.	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	•			
Ť			- 7/20					1	1	1
7		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	•			
3	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
3	癌	5-FU注1000mg20mL								
8		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	【化療混注】	メイン	22時間	•			
		5-FU注250mg5mL	600 mg/m2	埋込型CVポート						
1	癌	5-FU注1000mg20mL								
				100 A 5 100 A 5 100 A 5		0				
9		大塚生食注100mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分		•		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管					-		
40			, ¥T	埋込型CVポート	1.0	2時間			1	
10		人	1 瓶 100 mg/m2	理込型UVボート	メイン	2吋[日]		-		-
		レボホリナート点滴静注用100mg	100 mg/mz							
		レババファ I 無周野圧用 I Oomg								
11			1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	1	•	+	1
		5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート	- 1-			1	1	1
		5-FU注1000mg20mL								
Ť		-								
12		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	【化療混注】	メイン	22時間		•		
		5-FU注250mg5mL	600 mg/m2	埋込型CVポート						
- 1	癌	5-FU注1000mg20mL								
13		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ			•	
						day3に使用				
				ļ.,	ļ	(5)	ļ	1		
14		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	ļ		•	
_						day3に使用	ļ	1	1	1