

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	エムフォルフオックスシックスプラスシーマブ 大腸癌mFOLFOX6+Cmab 1週毎(ポンプ)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	■ 外来                    ■ 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day8	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		●	
2		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサード注射液3.3mg1mL ポララミン注5mg0.5%1mL	1 袋 3 管 1 管		埋込型CVポート	メイン 15分	●			
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
4		大塚生食注250mL 癌 アービタックス注射液100mg 20mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	初回は2時間 2回目以降は1時間	●			
			初回は400mg/m2 2回目以降は250mg/m2	埋込型CVポート		全量250mLに調製				
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
6		大塚糖液5% 250mL レボホリナート点滴静注用25mg レボホリナート点滴静注用100mg	1 瓶 200 mg/m2	埋込型CVポート	メイン	2時間 オキサリプラチンと同時	●			
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残液棄	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注100mL 癌 5-FU注250mg5mL 癌 5-FU注1000mg20mL	1 瓶 400 mg/m2	【化療混注】	メイン	10分	●			
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
12		大塚生食注100mL 癌 5-FU注250mg5mL 癌 5-FU注1000mg20mL	薬剤部で用量調整 2400 mg/m2	【化療混注】	ヒューバー針に接続 埋込型CVポート	46時間 埋込型CVポートはポンプ	●			
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●		
14		大塚生食注100mL デキサード注射液3.3mg1mL ポララミン注5mg0.5%1mL	1 袋 1 管 1 管	埋込型CVポート	メイン	15分			●	
15		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため			●	
16		大塚生食注250mL 癌 アービタックス注射液100mg 20mL	1 瓶 250 mg/m2	【化療混注】	メイン	1時間			●	
				埋込型CVポート		全量250mLに調製				
17		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ			●	
18		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時			●	