

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	エムフォルフォックスシックスプラスシーマブ 大腸癌mFOLFOX6+Cmab 1週毎(ラクテック持続)	ポート以外
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day8	day14
1		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
		ポラミン注5mg0.5%1mL	1 管							
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
3		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	初回は2時間	●			
	癌	アービタックス注射液100mg 20mL	初回は400mg/m2 2回目以降は250mg/m2	点滴静注		2回目以降は1時間 全量250mLに調製				
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	点滴静注	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	プライミングして壊滅薬	●			
7		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	点滴静注						
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●			
9		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
10		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ day3に使用		●		
12		大塚生食注100mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分			●	
		デキサート注射液3.3mg1mL	1 管							
		ポラミン注5mg0.5%1mL	1 管							
13		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため			●	
14		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間			●	
	癌	アービタックス注射液100mg 20mL	250 mg/m2	点滴静注		全量250mLに調製				
15		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ			●	