

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	エムフォルフォックスシックスプラスシーマブ 大腸癌mFOLFOX6+Cmab 1週毎(ラクテック持続)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rp	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day8	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		●	
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
		ポラミン注5mg0.5%1mL	1 管							
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
						配合変化回避のため				
4		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	初回は2時間	●			
癌		アービタックス注射液100mg 20mL	初回は400mg/m2 2回目以降は250mg/m2	埋込型CVポート		2回目以降は1時間				
				全量250mLに調製						
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
						配合変化回避のため				
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして蒸気薬	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
癌		オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
癌		5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		5-FU注1000mg20mL								
11		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●			
癌		5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		5-FU注1000mg20mL								
12		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ		●		
						day3に使用				
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時		●		
						day3に使用				
14		大塚生食注100mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分			●	
		デキサート注射液3.3mg1mL	1 管							
		ポラミン注5mg0.5%1mL	1 管							
15		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ			●	
						配合変化回避のため				
16		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間			●	
癌		アービタックス注射液100mg 20mL	250 mg/m2	埋込型CVポート						
				全量250mLに調製						
17		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ			●	
18		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時			●	