

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	エムフォルフオックスシックスプラスシーマブ 大腸癌mFOLFOX6+Cmab2週毎(ポンプ)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	■ 外来	■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3		day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		アロキシン点滴静注バッグ0. 75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3. 3mg1 mL	3 管							
		ボラミン注5mg0. 5%1 mL	1 管							
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
						配合変化回避のため				
4		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●			
癌		アービタックス注射液100mg 20mL	500 mg/m2	埋込型CVポート		<small>(2日目90分、3日目以降60分でも可)</small>				
				全量250mLに調製						
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
						配合変化回避のため				
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破薬	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
癌		オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
癌		5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
癌		5-FU注1000mg20mL								
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
12		大塚生食注100mL	薬剤部で用量調整	【化療混注】	ヒューバー針に接続	46時間	●			
癌		5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	埋込型CVポート	<small>携帯型デイスポンザブル注入ポンプで</small>					
癌		5-FU注1000mg20mL								
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時		●		
						day3に使用				