

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	エスエルファイブエフーツープラスビーマブ 大腸癌sLV5FU2+Pmab(ポンプ) ポート
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3		day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 袋 3 管	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
4		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間	●			
	癌	ベクティビックス点滴静注100mg	6 mg/kg	埋込型CVポート インラインフィルター使用						
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
6		大塚糖液5% 250mL レボホリナート点滴静注用25mg レボホリナート点滴静注用100mg	1 瓶 200 mg/m2	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
7		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●			
9		大塚生食注100mL	薬剤部で用量調整	【化療混注】	ヒューバー針に接続	46時間	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	埋込型CVポート	携帯型ディスプレイボール注入ポンプで					
	癌	5-FU注1000mg20mL								
10		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●		