

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	フォルフォックスフォープラスビーマブ 大腸癌FOLFOX4+Bmab	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	プライミングして残破薬	●			
3		大塚生食注 100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●			
	癌	アバステン点滴静注用100mg4mL	5 mg/kg	埋込型CVポート		<small>※投与前、混注は90分以内</small>				
	癌	アバステン点滴静注用400mg16mL								
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
5		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキササート注射液3.3mg1mL	3 管							
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	100 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破薬	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注 100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
11		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	【化療混注】	メイン	22時間	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	600 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
12		大塚生食注 100mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分		●		
		デキササート注射液3.3mg1mL	3 管							
13		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間		●		
		レボホリナート点滴静注用25mg	100 mg/m2							
		レボホリナート点滴静注用100mg								
14		大塚生食注 100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分		●		
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
15		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	【化療混注】	メイン	22時間		●		
	癌	5-FU注250mg5mL	600 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
16		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ day31に使用			●	
17		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day31に使用			●	