

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	フォルフォックスフォー 大腸癌FOLFOX4	ポート以外
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	<input checked="" type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day14
1		アロキシン点滴静注/バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
2		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	点滴静注	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	100 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	プライミングして残破薬	●			
4		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	点滴静注						
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●			
6		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
7		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	【化療混注】	メイン	22時間	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	600 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
8		大塚生食注100mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分		●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
9		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	点滴静注	メイン	2時間		●		
		レボホリナート点滴静注用25mg	100 mg/m2							
		レボホリナート点滴静注用100mg								
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分		●		
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
11		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	【化療混注】	メイン	22時間		●		
	癌	5-FU注250mg5mL	600 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
12		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ day3に使用			●	