

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	フォルフォキシリ 大腸癌FOLFOXIRI(ポンプ)	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	14日	
対象患者区分	■ 外来	■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		大塚生食注100mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	30分	●			
		プロイメンド点滴静注150mg	1 V							
3		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A							
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
						プロイメンド投与後の時間待ち				
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●			
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	165 mg/m <sup>2</sup>	埋込型CVポート						
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg	添付文書上の上限は150mg/m <sup>2</sup>							
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m <sup>2</sup>			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破棄	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
癌		オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m <sup>2</sup>	埋込型CVポート						
癌		オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
10		大塚生食注100mL	薬剤部で用量調整	【化療混注】	ヒューパー針に接続	46時間	●			
癌		5-FU注250mg5mL	3200 mg/m <sup>2</sup>	埋込型CVポート	携帯型ディスプレイ注入ポンプで					
癌		5-FU注1000mg20mL								
11		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●			
						day31に使用				