

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	ゼリリプラスピーマブ 大腸癌XELIRI+Bmab	ポート以外
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ゼローダ錠300mg	1.36m <sup>2</sup> 未満	1回1200mg(4錠)	夕●	→	朝●
			1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満	1回1500mg(5錠)			
			1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満	1回1800mg(6錠)			
			1.96m <sup>2</sup> 以上	1回2100mg(7錠)			
			1日2回朝夕食後				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day21
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破薬	●		
2		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●		
	癌	アバステン点滴静注用100mg4mL	7.5 mg/kg	点滴静注		(2回目60分、3回目以降30分でも可)			
	癌	アバステン点滴静注用400mg16mL							
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		
4		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A						
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●		
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注					
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg	添付文書上の上限は150mg/m <sup>2</sup>						
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●		