がん化学療法レジメン

目次に戻る

	ゼリリ	
レジメン名	大腸癌XELIRI	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院	

Rр	. 癌	薬品名	投与量		day 1		day15	day21
	1 癌	ゼローダ錠300mg	1.36m ² 未満	1回1200mg(4錠)	タ●	\rightarrow	朝●	
			1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1回1500mg(5錠)				
			1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1回1800mg(6錠)				
			1.96m ² 以上	1回2100mg(7錠)				
			1 日 2回朝夕食後					

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day21
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時		
2		アロキシ点滴静注バッグ0. 75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	•	
		デキサート注射液3. 3mg1mL	3 A					
3		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	•	
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	200 mg/m2	埋込型CVポート				
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg	添付文書上の上限は150mg/m2					
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	•	
5		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	•	