

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	カベオックス 大腸癌CapeOX	ポート
対象疾患	大腸癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ゼローダ錠300mg	1.36m ² 未満	1回1200mg(4錠)	夕●	→	朝●
			1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1回1500mg(5錠)			
			1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1回1800mg(6錠)			
			1.96m ² 以上	1回2100mg(7錠)			
			1日2回朝夕食後				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day21
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1筒	ルートロック	メイン	開始時	●		
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	2A						
3		大塚糖液5% 250mL	1瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	1A	埋込型CVポート					
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	130 mg/m ²						
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL							
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
5		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1瓶	ルートロック	メイン	終了時	●		

備考: 通常末梢から投与するレジメンであるため、オキサリプラチンの血管痛予防のためデキサートを1Aオキサリプラチンのほうへ混注しているのでアロキシのほうは2Aとなっている