

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	胃癌S-1+CDDP	ポート以外
対象疾患	胃癌	
1コース日数	35日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 入院
申請医師診療科 氏名		
登録年月日		

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day8	day9	day10	day22	day35
1	癌	ティーエスワン配合カプセルT25	体表面積	初回基準量	夕●	→	→	→	朝●
		ティーエスワン配合カプセルT20	1.25m ² 未満						
		エスワンタイホウ配合OD錠T25	1.25m ² 以上1.5m ² 未満						
		エスワンタイホウ配合OD錠T20	1.5m ² 以上						
		ティーエスワン配合顆粒T25	1日2回朝夕食後						

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day8	day9	day10
1		テルモ生食1000mL	1 袋	点滴静注	メイン	4時間で	●		
2		大塚生食注100mL	1 瓶	点滴静注	側管	30分	●		
		プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶						
3		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 瓶	点滴静注	側管	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A						
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	15分	●		
						プロイメンド投与後の時間待ち			
5		大塚生食注500mL	1 袋	【化療混注】	側管	2時間	●		
癌		ランダ注50mg100mL	60 mg/m ²	点滴静注					
癌		ランダ注10mg20mL		全量を500mLに調製					
6		ラクテック注1L	1 袋	点滴静注	メイン	9時間で	●		
7		マンニトールS注射液300mL	1 瓶	点滴静注	側管	2時間	●		
						Rp6のラクテックと同時			
8		ラクテック注1L	1 袋	点滴静注	メイン	9時間で	●		
9		ラクテック注1L	1 袋	点滴静注	メイン	12時間で		●	●
10		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	15分		●	●
		デキサート注射液3.3mg1mL	1 A						
11		ラクテック注1L	1 袋	点滴静注	メイン	12時間で		●	●