

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

| | | |
|------------|--|-----|
| レジメン名 | 胃癌S-1+CDDP | ポート |
| 対象疾患 | 胃癌 | |
| 1コース日数 | 35日 | |
| 対象患者区分 | <input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院 | |
| 申請医師診療科 氏名 | | |
| 登録年月日 | | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | day 1 | day8 | day9 | day10 | day22 | day35 |
|-----|---|------------------|---|--------|------|------|-------|-------|-------|
| 1 | 癌 | ティーエスワン配合カプセルT25 | 体表面積 | 初回基準量 | タ● | → | → | → | 朝● |
| | | ティーエスワン配合カプセルT20 | 1.25m ² 未満 | 40mg/回 | | | | | |
| | | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 | 50mg/回 | | | | | |
| | | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 1.5m ² 以上 | 60mg/回 | | | | | |
| | | ティーエスワン配合顆粒T25 | 1日2回朝夕食後 | | | | | | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間 | day8 | day9 | day10 |
|-----|---|------------------------|----------------------|-------------|-------|----------------|------|------|-------|
| 1 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 開始時 | ● | | |
| 2 | | テルモ生食1000mL | 1 袋 | 埋込型CVポート | メイン | 4時間で | ● | | |
| 3 | | 大塚生食注100mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | 側管 | 30分 | ● | | |
| | | プロイメンド点滴静注用150mg | 1 瓶 | | | | | | |
| 4 | | アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | 側管 | 15分 | ● | | |
| | | デキサート注射液3.3mg1mL | 3 A | | | | | | |
| 5 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | 側管 | 15分 | ● | | |
| | | | | | | プロイメンド投与後の時間待ち | | | |
| 6 | | 大塚生食注500mL | 1 袋 | 【化療混注】 | 側管 | 2時間 | ● | | |
| 癌 | | ランダ注50mg100mL | 60 mg/m ² | 埋込型CVポート | | | | | |
| 癌 | | ランダ注10mg20mL | | 全量を500mLに調製 | | | | | |
| 7 | | ラクテック注1L | 1 袋 | 埋込型CVポート | メイン | 9時間で | ● | | |
| 8 | | マンニトールS注射液300mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | 側管 | 2時間 | ● | | |
| | | | | | | Rp7のラクテックと同時 | | | |
| 9 | | ラクテック注1L | 1 袋 | 埋込型CVポート | メイン | 9時間で | ● | | |
| 10 | | ラクテック注1L | 1 袋 | 埋込型CVポート | メイン | 12時間で | | ● | ● |
| 11 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 埋込型CVポート | 側管 | 15分 | | ● | ● |
| | | デキサート注射液3.3mg1mL | 1 A | | | | | | |
| 12 | | ラクテック注1L | 1 袋 | 埋込型CVポート | メイン | 12時間で | | ● | ● |
| 13 | | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 1 筒 | ルートロック | メイン | 終了時 | | | ● |