

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	胃癌DS	ポート
対象疾患	胃癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	■ 外来	■ 入院
申請医師診療科 氏名		
登録年月日		

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ティーエスワン配合カプセルT25	1.25m ² 未満	80mg/日	夕●	→	朝●
		ティーエスワン配合カプセルT20	1.36m ² 以上1.66m ² 未満	100mg/日			
		エスワンタイホウ配合OD錠T25	1.96m ² 以上	120mg/日			
		エスワンタイホウ配合OD錠T20	1日2回朝夕食後				
		ティーエスワン配合顆粒T25					

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day21
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A						
3		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間	●		
	癌	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	40 mg/m ²	埋込型CVポート					
	癌	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL							
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
5		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時	●		

- ・ DSの全体像は1コース目TS-1単独で2週間投与1週間休薬後の2~7コースがこのレジメンとなっており、8~11or12コースまでTS-1を4週間投与2週間休薬で続ける
- ・ 術後6週間以内に治療開始
- ・ 浮腫予防のためday2にデカドロン錠4mgを1日2錠1回1錠朝夕食後投与が望ましい