

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	ハイパーシーバッド 血液癌Hyper-CVAD	ポート以外
対象疾患	血液癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	生食注シリンジ <input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6		day 11	day 12	day 18	day 19
1		イメンドカプセル125mg	1錠	●										
		イメンドカプセル80mg	1錠		●	●								
2		バクタ配合錠	1錠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6		day11	day12	day13	day14
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 瓶	中心静脈	メイン	30分	●										
		デキサート注射液3.3mg1mL	10 A														
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	中心静脈	メイン	30分		●	●	●				●	●	●	●
		デキサート注射液3.3mg1mL	10 A														
3	癌	注射用エンドキサン500mg	300 mg/m2	【化療混注】	側管	1時間	●	●	●								
		大塚生食注250mL		中心静脈	閉鎖式レバーロックに接続	12時間毎											
				バックアダプタ装着													
4	癌	オンコピン注射用1mg	1.4 mg/m2	【化療混注】	メイン	5分				●				●			
		生理食塩液「ヒカリ」50mL		中心静脈													
5		ソルデム3A輸液500mL	1 袋	中心静脈	メイン	40mL/h	●	●	●								
						残破棄											
6	癌	注射用エンドキサン500mg	300 mg/m2	【化療混注】	側管	1時間	●	●	●								
		大塚生食注250mL		中心静脈	閉鎖式レバーロックに接続	1回目エンドキサンから12時間後											
				バックアダプタ装着													
7		ソルデム3A輸液500mL	1 袋	中心静脈	メイン	20mL/h	●	●									
						残破棄											
8	癌	アドリアシン注用10mg	50 mg/m2	【化療混注】	メイン	15分				●							
		大塚生食注100mL		中心静脈													
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	中心静脈	メイン	全開にてフラッシュ			●	●				●			