

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	ハイパーシーバッド 血液癌Hyper-CVAD	ポート
対象疾患	血液癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	ヘパリンNaロック <input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6		day 11	day 12	day 18	day 19
1		イメンドカプセル125mg	1錠	●										
		イメンドカプセル80mg	1錠		●	●								
2		バクタ配合錠	1錠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6		day11	day12	day13	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●							●			
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 瓶 10 A	中心静脈	メイン	30分	●										
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 瓶 10 A	中心静脈	メイン	30分		●	●	●				●	●	●	●
4	癌	注射用エンドキサン500mg 大塚生食注250mL	300 mg/m2	【化療混注】 中心静脈	側管 閉鎖式レバーロックに接続 バックアダプタ装着	1時間 12時間毎	●	●	●								
5	癌	オンコピン注射用1mg 生理食塩液「ヒカリ」50mL	1.4 mg/m2	【化療混注】 中心静脈	メイン	5分		●						●			
6		ソルデム3A輸液500mL	1 袋	中心静脈	メイン	40mL/h 残破棄	●	●	●								
7	癌	注射用エンドキサン500mg 大塚生食注250mL	300 mg/m2	【化療混注】 中心静脈	側管 閉鎖式レバーロックに接続 バックアダプタ装着	1時間 1回目エンドキサンから12時間後	●	●	●								
8		ソルデム3A輸液500mL	1 袋	中心静脈	メイン	20mL/h 残破棄	●	●									
9	癌	アドリアシン注用10mg 大塚生食注100mL	50 mg/m2	【化療混注】 中心静脈	メイン	15分				●							
10		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	中心静脈	メイン	全開にてフラッシュ			●	●				●			
11		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時				●							●