

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	アールチョップ 血液癌RCHOP		ポート以外
対象疾患	血液癌		
1コース日数	21日		
対象患者区分	生食注シリンジ	<input type="checkbox"/> 外来	<input checked="" type="checkbox"/> 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day 2	day6	day21
1		プレドニン錠5mg	最大100mg/m ² /日 1日2回朝昼食後	昼●	→	朝●	
2		カロナール錠500mg レスタミンコーワ錠10mg	1錠 3錠 リツキサン投与時30分前	●			

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day6	day21
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●			
2	癌	リツキサン点滴静注500mg50mL	375 mg/m ²	【化療混注】	メイン	投与速度は指示コメント参照	●			
	癌	リツキサン点滴静注100mg10mL 大塚生食注500mL	1 袋	点滴静注 薬剤部にて10倍用量調製						
3		大塚生食注20mL	1 A	点滴静注		リツキサン希釈用	●			
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●			
5		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分		●		
6	癌	オンコビン注射用1mg 生理食塩液「ヒカリ」50mL	1.4 mg/m ² 1 瓶	【化療混注】 点滴静注	閉鎖式レバーロックに接続	5分		●		
				バックアダプタ装着						
7	癌	アドリアシン注用10mg 大塚生食注100mL	50 mg/m ² 1 瓶	【化療混注】 点滴静注	閉鎖式レバーロックに接続	15分		●		
				バックアダプタ装着						
8	癌	注射用エンドキサン500mg 大塚生食注250mL	750 mg/m ² 1 袋	【化療混注】 点滴静注	閉鎖式レバーロックに接続	60分		●		
				バックアダプタ装着						
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	閉鎖式レバーロックに接続	全開にてフラッシュ		●		
				バックアダプタ装着						