

がん化学療法レジメン

| | |
|------------|--------------------------------|
| レジメン名 | 胃癌SOX+Tmab 第1クール |
| 対象疾患 | 胃癌 |
| 1コース日数 | 21日 |
| 対象患者区分 | ■ 外来 ■ 入院 |
| 申請医師診療科 氏名 | |
| 登録年月日 | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | day 1 | | day15 | day21 |
|-----|---|------------------|---|--------|----|-------|-------|
| 1 | 癌 | ティーエスワン配合カプセルT25 | 体表面積 | 初回基準量 | 夕● | → | 朝● |
| | | ティーエスワン配合カプセルT20 | 1.25m ² 未満 | 40mg/回 | | | |
| | | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 | 50mg/回 | | | |
| | | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 1.5m ² 以上 | 60mg/回 | | | |
| | | ティーエスワン配合顆粒T25 | 1日2回朝夕食後 | | | | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間 | day1 | | | day21 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------|-------|------------------------|------|--|--|-------|
| 1 | | アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL | 1 袋 | 点滴静注 | メイン | 15分 | ● | | | |
| | | デキサート注射液3.3mg1mL | 2 A | | | | | | | |
| 2 | | 大塚糖液5% 250mL | 1 瓶 | 【化療混注】 | メイン | 2時間 | ● | | | |
| 癌 | | オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL | 130 mg/m ² | 点滴静注 | | | | | | |
| 癌 | | オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL | | | | | | | | |
| | | デキサート注射液3.3mg1mL | 1 A | | | | | | | |
| 3 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 点滴静注 | メイン | 配合変化回避のため 全開にてフラッシュ | ● | | | |
| 4 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 点滴静注 | メイン | 15分 | ● | | | |
| | | ポララミン注5mg0.5%1mL | 1 A | | | | | | | |
| 5 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 点滴静注 | メイン | 全開にてフラッシュ 配合変化回避のため | ● | | | |
| 6 | | 大塚生食注250mL | 1 袋 | 【化療混注】 | メイン | 90分 | ● | | | |
| 癌 | | トラスツズマブBS点滴静注用150mg | 8 mg/kg | 点滴静注 | | (2回目以降30分でも可) | | | | |
| 癌 | | トラスツズマブBS点滴静注用60mg | | | | | | | | |
| | | 大塚蒸留水 20mL | 1 A | 薬剤部にて用量調整 | | トラスツズマブ溶解用 | | | | |
| 7 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 点滴静注 | メイン | 全開にてフラッシュ | ● | | | |