

がん化学療法レジメン

レジメン名	胃癌SOX+Tmab 第2クール以降
対象疾患	胃癌
1コース日数	21日
対象患者区分	■ 外来                      ■ 入院
申請医師診療科 氏名	
登録年月日	

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ティーエスワン配合カプセルT25	体表面積	初回基準量	夕●	→	朝●
		ティーエスワン配合カプセルT20	1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回			
		エスワンタイホウ配合OD錠T25	1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回			
		エスワンタイホウ配合OD錠T20	1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回			
		ティーエスワン配合顆粒T25	1日2回朝夕食後				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day21
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 A						
2		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●		
癌		オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注					
癌		オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL							
		デキサート注射液3.3mg1mL	1 A						
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	トラスツズマブがブドウ糖で蛋白凝集するため 全開にてフラッシュ	●		
4		大塚生食注250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	90分	●		
癌		トラスツズマブBS点滴静注用150mg	6 mg/kg	点滴静注		(2回目以降30分でも可)			
癌		トラスツズマブBS点滴静注用60mg							
		大塚蒸留水 20mL	1 A	薬剤部にて用量調整		トラスツズマブ溶解用			
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●		