

がん化学療法レジメン

レジメン名	食道癌化学放射線療法FP
対象疾患	食道癌
1コース日数	28日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day4	day5	day28
1		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●		
2		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●		
3		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●		
4		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●		
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管①	プライミングして残破棄	●					
6		テルモ生食1000mL	1 袋	【化療混注】	側管①	24時間	●	●	●	●		
	癌	5-FU注250mg5mL	700 mg/m2	点滴静注								
	癌	5-FU注1000mg20mL										
7		ラクテック注500mL	1 袋	点滴静注	側管②-1	250mL/h	●					
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管②-2	全開にてフラッシュ	●					
9		大塚生食注100mL	1 瓶	点滴静注	側管②-3	30分	●					
		プロイメンド点滴静注150mg	1 瓶			ランダ投与1時間前に						
10		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	側管②-4	15分	●					
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管									
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管②-5	15分	●					
						プロイメンド投与後の時間待ち						
12		大塚生食注500mL	1 袋	【化療混注】	側管②-6	2時間	●					
	癌	ランダ注10mg 20mL	70 mg/m2	点滴静注								
	癌	ランダ注50mg 100mL		全量500mLに調製								
13		ラクテック注1L	1 袋	点滴静注	側管②-7	250mL/h	●					
14		マンニトールS注射液 300mL	1 瓶	点滴静注	側管②-8	150mL/h	●					
15		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管②	15分		●	●	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 管									
16		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管①	全開にてフラッシュ					●	
						day5						