

がん化学療法レジメン

レジメン名	フォルフィリ 大腸癌FOLFIRI(ラクテック持続)
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3		day14
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
2		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	点滴静注	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用100mg	200 mg/m2			イリノテカンと同時				
		レボホリナート点滴静注用25mg								
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	プライミングして残破棄	●			
4		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	90分	●			
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	150 mg/m2	点滴静注						
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg								
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●			
6		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
7		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	点滴静注						
	癌	5-FU注1000mg20mL								
10		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ day3に使用		●		