

がん化学療法レジメン

レジメン名	フォルフィリプラスビーマブ 大腸癌FOLFIRI+Pmab(ポンプ)
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		
2		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管						
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
4		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間	●		
癌		ベクティビックス点滴静注100mg	6 mg/kg	埋込型CVポート					
				インラインフィルター使用					
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●		
		レボホリナート点滴静注用100mg	200 mg/m2			イリノテカンと同時			
		レボホリナート点滴静注用25mg							
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残液棄	●		
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	90分	●		
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	150 mg/m2	埋込型CVポート					
癌		イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg							
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●		
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●		
癌		5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	埋込型CVポート					
癌		5-FU注1000mg20mL							
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ	●		
12		大塚生食注100mL	薬剤部で用量調節	【化療混注】	ヒューバー針に接続	46時間	●		
癌		5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	埋込型CVポート	携帯型デイスボーズフル注入ポンプで				
癌		5-FU注1000mg20mL							
13		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時		●	
						day3に使用			