

がん化学療法レジメン

レジメン名	フォルフィリプラスアールマブ 大腸癌FOLFIRI+Rmab(ラクテック持続)
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day14
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管						
		ポラミン注5mg0.5%1mL	1 管						
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		
3		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間	●		
	癌	サイラムザ点滴静注液100mg	8 mg/kg	点滴静注					
	癌	サイラムザ点滴静注液500mg		インラインフィルター使用 全量250mLに調製					
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	1時間 3回目以降は全開にてフラッシュ	●		
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	点滴静注	メイン	2時間	●		
		レボホリナート点滴静注用100mg	200 mg/m2			イリノテカンと同時			
		レボホリナート点滴静注用25mg							
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	プライミングして残破棄	●		
7		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	90分	●		
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	150 mg/m2	点滴静注					
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg							
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●		
9		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●		
	癌	5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	点滴静注					
	癌	5-FU注1000mg20mL							
10		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●		
	癌	5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	点滴静注					
	癌	5-FU注1000mg20mL							
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ day3に使用		●	