

がん化学療法レジメン

レジメン名	エムフォルフォックスシックスプラスシーマブ 大腸癌mFOLFOX6+Cmab2週毎(ラクテック持続)
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3	day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●		
2		アロキシン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管						
		ポララミン注5mg0.5%1mL	1 管						
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		
4		大塚生食注250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●		
癌		アービタックス注射液100mg 20mL	500 mg/m ²	埋込型CVポート 全量250mLに調製		<small>(2回目90分、3回目以降60分でも可)</small>			
5		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		
6		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●		
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m ²			オキサリプラチンと同時			
		レボホリナート点滴静注用100mg							
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	ブライミングして残破棄	●		
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●		
癌		オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m ²	埋込型CVポート					
癌		オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL							
9		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●		
10		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●		
癌		5-FU注250mg5mL	400 mg/m ²	埋込型CVポート					
癌		5-FU注1000mg20mL							
11		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●		
癌		5-FU注250mg5mL	2400 mg/m ²	埋込型CVポート					
癌		5-FU注1000mg20mL							
12		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用		●	