

がん化学療法レジメン

レジメン名	エムフォルフォックスシックスプラスビーマブ 大腸癌mFOLFOX6+Pmab(ラクテック持続)
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day3		day14
1		アロキン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管							
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●			
						配合変化回避のため				
3		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	1時間	●			
癌		ベクティビックス点滴静注100mg	6 mg/kg	点滴静注						
				インラインフィルター使用						
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●			
						配合変化回避のため				
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	点滴静注	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	プライミングして残破棄	●			
7		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
癌		オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	点滴静注						
癌		オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管	全開にてフラッシュ	●			
9		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
癌		5-FU注250mg5mL	400 mg/m2	点滴静注						
癌		5-FU注1000mg20mL								
10		ラクテック注 1L	1 袋	【化療混注】	メイン	46時間	●			
癌		5-FU注250mg5mL	2400 mg/m2	点滴静注						
癌		5-FU注1000mg20mL								
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ		●		
						day3に使用				