

がん化学療法レジメン

| | |
|--------|--------------------------------|
| レジメン名 | カペオックス 大腸癌CapeOX |
| 対象疾患 | 大腸癌 |
| 1コース日数 | 21日 |
| 対象患者区分 | ■ 外来 ■ 入院 |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | day 1 | | day15 | day21 |
|-----|---|------------|--|--------------|----|-------|-------|
| 1 | 癌 | ゼローダ錠300mg | 1.36m ² 未満 | 1回1200mg(4錠) | 夕● | → | 朝● |
| | | | 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 | 1回1500mg(5錠) | | | |
| | | | 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 | 1回1800mg(6錠) | | | |
| | | | 1.96m ² 以上 | 1回2100mg(7錠) | | | |
| | | | 1日2回朝夕食後 | | | | |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間 | day1 | | day21 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|--------|-------|-----------|------|--|-------|
| 1 | | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL | 1袋 | 点滴静注 | メイン | 15分 | ● | | |
| | | デキサート注射液3.3mg1mL | 2A | | | | | | |
| 2 | | 大塚糖液5% 250mL | 1瓶 | 【化療混注】 | メイン | 2時間 | ● | | |
| | | デキサート注射液3.3mg1mL | 1A | 点滴静注 | | | | | |
| | 癌 | オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL | 130 mg/m ² | | | | | | |
| | 癌 | オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL | | | | | | | |
| 3 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1瓶 | 点滴静注 | メイン | 全開にてフラッシュ | ● | | |

備考: オキサリプラチンの血管痛予防のためデキサートを1Aオキサリプラチンへ混注しているのでアロキシへの混注分は2Aとなっている。