

がん化学療法レジメン

レジメン名	カペオックスプラスビーマブ 大腸癌CapeOX+Bmab
対象疾患	大腸癌
1コース日数	21日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ゼローダ錠300mg	1.36m ² 未満	1回1200mg(4錠)	夕●	→	朝●
			1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1回1500mg(5錠)			
			1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1回1800mg(6錠)			
			1.96m ² 以上	1回2100mg(7錠)			
			1日2回朝夕食後				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1		day21
1		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1袋	点滴静注	メイン	15分	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	2A						
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		
3		大塚生食注100mL	1瓶	【化療混注】	メイン	90分	●		
	癌	アバステン点滴静注用100mg4mL	7.5 mg/kg	点滴静注		(2回目60分、3回目以降30分でも可)			
	癌	アバステン点滴静注用400mg16mL							
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●		
5		大塚糖液5% 250mL	1瓶	【化療混注】	メイン	2時間	●		
		デキサート注射液3.3mg1mL	1A	点滴静注					
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	130 mg/m ²						
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL							
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●		

備考: オキサリプラチンの血管痛予防のためデキサートを1Aオキサリプラチンへ混注しているためアロキシへは2A混注となっている