

がん化学療法レジメン

レジメン名	フォルフォキシリプラスビーマブ 大腸癌FOLFOXIRI+Bmab (ポンプ)
対象疾患	大腸癌
1コース日数	14日
対象患者区分	■ 外来                      ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day14
1		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	開始時	●			
2		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	プライミングして残破棄	●			
3		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●			
	癌	アバステン点滴静注用100mg4mL	5 mg/kg	埋込型CVポート		(2回目40分、3回目以降30分でも可)				
	癌	アバステン点滴静注用100mg4mL								
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
5		大塚生食注100mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	30分	●			
		プロイメンド点滴静注150mg	1 V							
6		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	埋込型CVポート	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 A							
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	15分 プロイメンド投与後の時間待ち	●			
8		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●			
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	165 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg	添付文書上の上限は150mg/m2							
9		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	埋込型CVポート	メイン	2時間	●			
		レボホリナート点滴静注用25mg	200 mg/m2			オキサリプラチンと同時				
		レボホリナート点滴静注用100mg								
10		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	プライミングして残破棄	●			
11		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	側管	2時間	●			
	癌	オキサリプラチン点滴静注液100mg20mL	85 mg/m2	埋込型CVポート						
	癌	オキサリプラチン点滴静注液50mg10mL								
12		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	埋込型CVポート	側管	全開にてフラッシュ	●			
13		大塚生食注100mL	薬剤部で用量調整	【化療混注】	ヒューバー針に接続	46時間	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	3200 mg/m2	埋込型CVポート	携帯型デュスボーダブル注入ポンプで					
	癌	5-FU注1000mg20mL								
14		生食注シリンジ「オーツカ」10mL	1 筒	ルートロック	メイン	終了時 day3に使用	●			