

がん化学療法レジメン

レジメン名	ゼリリプラスピーマブ 大腸癌XELIRI+Bmab
対象疾患	大腸癌
1コース日数	21日
対象患者区分	■ 外来                      ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1		day15	day21
1	癌	ゼローダ錠300mg	1.36m <sup>2</sup> 未満 1.36m <sup>2</sup> 以上1.66m <sup>2</sup> 未満 1.66m <sup>2</sup> 以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1.96m <sup>2</sup> 以上 1日 2回朝夕食後	1回1200mg(4錠) 1回1500mg(5錠) 1回1800mg(6錠) 1回2100mg(7錠)	夕●	→	朝●

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day21
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●			
2		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●			
	癌	アバスチン点滴静注用100mg4mL	7.5 mg/kg	点滴静注		(2回目60分、3回目以降30分でも可)				
	癌	アバスチン点滴静注用400mg16mL								
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ 配合変化回避のため	●			
4		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL デキサート注射液3.3mg1mL	1 袋 3 A	点滴静注	メイン	15分	●			
5		大塚糖液5% 250mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	90分	●			
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注						
	癌	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg								
6		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●			

・イリノテカンの添付文書上の上限は150mg/m<sup>2</sup>