

がん化学療法レジメン

| | |
|--------|--------------------------------|
| レジメン名 | シーマブ 大腸癌Cmab 2週毎 |
| 対象疾患 | 大腸癌 |
| 1コース日数 | 14日 |
| 対象患者区分 | ■ 外来 ■ 入院 |

| Rp. | 癌 | 薬品名 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 点滴時間 | day1 | | | day14 |
|-----|---|----------------------|-----------|--------------------|-------|------------------------|------|--|--|-------|
| 1 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 点滴静注 | メイン | 15分 | ● | | | |
| | | デキサート注射液3. 3mg1mL | 1 A | | | | | | | |
| | | ポララミン注5mg0. 5%1mL | 1 A | | | | | | | |
| 2 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 点滴静注 | メイン | 全開にてフラッシュ 配合変化回避のため | ● | | | |
| 3 | | 大塚生食注250mL | 1 瓶 | 【化療混注】 | メイン | 2時間 | ● | | | |
| | 癌 | アービタックス注射液100mg 20mL | 500 mg/m2 | 点滴静注 全量250mLに調製 | | (2回目90分、3回目以降60分でも可) | | | | |
| 4 | | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 1 瓶 | 点滴静注 | メイン | 全開にてフラッシュ | ● | | | |