

## がん化学療法レジメン

レジメン名	脳腫瘍再発TMZ
対象疾患	悪性神経膠腫
1コース日数	28日
対象患者区分	■ 外来                      ■ 入院
申請医師診療科 氏名	脳神経外科
登録年月日	2017年9月22日

Rp.	癌	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day28
1	*	テモダールカプセル100mg	1回150mg/m <sup>2</sup>	●	●	●	●	●	
	*	テモダールカプセル20mg	(第2コース以降200mg/m <sup>2</sup> に増量可)						
			1日1回空腹時						
			(食事の1時間以上前又は食後2時間以降に)						

- ・ テモゾロミドは、一般名テモゾロミド、略語TMZ
- ・ 以下のGradeは、NCI-CTCAE(National Cancer Institute - Common Terminology Criteria for Adverse Events 米国立がん研究所有害事象共通用語規準のグレード
- ・ 休薬等の目安

項目	各コース開始基準	増量基準	50mg/m <sup>2</sup> 減量基準
好中球数	1,500/mm <sup>3</sup> 以上	前コースの期間中最低値が 1,500/mm <sup>3</sup> 以上	直前のコースで最低値が 1,000/mm <sup>3</sup> 未満
血小板数	100,000/mm <sup>3</sup> 以上	前コースの期間中最低値が 100,000/mm <sup>3</sup> 以上	直前のコースで最低値が 50,000/mm <sup>3</sup> 未満
非血液学的な副作用 (脱毛、悪心、嘔吐以外)	基準なし	基準なし	直前のコースで Grade 3

好中球数及び血小板数が最低値に達するのは投与後22日以降と比較的遅いことが知られているので注意。  
中止基準

- ・ 100mg/m<sup>2</sup>/日未満に減量が必要となった場合