

がん化学療法レジメン

レジメン名	アールコップ 血液癌RCOP	
対象疾患	血液癌	
1コース日数	21日	
対象患者区分	<input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day 2	day6	day21
1		プレドニン錠5mg	45mg/m ² /日 1日2回朝食後	昼●	→	朝●	
2		カロナール錠500mg	1錠	●			
		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	●			
			リツキサン投与時30分前				

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2		day21
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●			
2	癌	リツキサン点滴静注500mg50mL	375 mg/m ²	【化療混注】	メイン	投与速度は指示コメント参照	●			
	癌	リツキサン点滴静注100mg10mL		点滴静注						
		大塚生食注500mL	1 袋	薬剤部にて10倍用量調製						
3		大塚生食注20mL	1 A	点滴静注		リツキサン希釈用	●			
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●			
5		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分		●		
6	癌	オンコピン注射用1mg	1.4 mg/m ²	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	5分		●		
		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注						
				バックアダプタ装着						
7	癌	注射用エンドキサン500mg	750 mg/m ²	【化療混注】	閉鎖式レバーロックに接続	60分		●		
		大塚生食注250mL	1 袋	点滴静注						
				バックアダプタ装着						
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	閉鎖式レバーロックに接続	全開にてフラッシュ		●		
				バックアダプタ装着						