

がん化学療法レジメン

レジメン名	アール 血管炎R第2クール以降
対象疾患	リウマチ性疾患
1コース日数	7日
対象患者区分	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input type="checkbox"/> 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day7
1		カロナール錠500mg	1錠	●	
		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	●	
			リツキサン投与30分前		

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day 1	day7
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●	
2	癌	リツキサン点滴静注500mg50mL	375 mg/m ²	【化療混注】	メイン	リツキサン投与30分前にカロナールとレスタミン内服	●	
	癌	リツキサン点滴静注100mg10mL		点滴静注		モニター装着、30分毎にバイタル確認		
		大塚生食注500mL	1 袋	薬剤部にて10倍に用量調製		100mL/hで開始、開始から30分後問題なければ200mL/h その後も30分毎にバイタル確認		
3		大塚生食注20mL	1 A	点滴静注		リツキサン希釈用	●	
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●	