

がん化学療法レジメン

レジメン名	肺癌CBDCA+Pembrolizumab+Pemetrexed
対象疾患	肺腺癌
1コース日数	21日 4コース
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day2	day3	day21
1		イメドカプセル	1日目125mg、2.3日目80mg	●	朝●	朝●	
2		パンビタン末	1g ★PEM投与7日前より服用、終了後3週まで服用	→	→	→	→

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1			day21
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●			
2		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	30分	●			
	癌	キイトルーダ点滴静注100mg4mL	200 mg	点滴静注						
				インラインフィルター使用						
3		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	メイン	15分	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 A							
4		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	配合変化回避のため 全開にてフラッシュ	●			
5		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	10分	●			
	癌	ペトレキセド点滴静注500mg20mL	500 mg/m2	点滴静注						
	癌	ペトレキセド点滴静注100mg4mL								
6		大塚糖液5% 250mL	1 袋	【化療混注】	メイン	1時間	●			
	癌	カルボプラチン点滴静注450mg45mL	AUC5	点滴静注						
	癌	カルボプラチン点滴静注150mg15mL								
	癌	カルボプラチン点滴静注50mg5mL								
7		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●			

- ・ ペトレキセドは扁平上皮癌には使えません
- ・ 初回投与7日前にプレミンS1mg筋注、9週毎に投与し、中止後も22日目まで投与