

がん化学療法レジメン

レジメン名	食道癌Nivo+standard FP
対象疾患	食道癌
1コース日数	28日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day15	day28
1		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄	●							
2		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	30分	●							
	癌	オブジーボ点滴静注240mg	240 mg/body	点滴静注										
				インラインフィルター使用										
3		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ	●							
4		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●			
5		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●			
6		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●			
7		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋	点滴静注	メイン	80mL/h	●	●	●	●	●			
8		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管①	プライミングして残破棄	●							
9		テルモ生食1000mL	1 袋	【化療混注】	側管①	24時間	●	●	●	●	●			
	癌	5-FU注250mg5mL	800 mg/m2	点滴静注		ランダ終了後に投与開始								
	癌	5-FU注1000mg20mL												
10		ラクテック注500mL	1 袋	点滴静注	側管②-1	250mL/h	●							
11		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管②-2	全開にてフラッシュ	●							
12		大塚生食注100mL	1 瓶	点滴静注	側管②-3	30分	●							
		プロイメンド点滴静注150mg	1 瓶			ランダ投与1時間前に								
13		アロキン点滴静注バッグ0.75mg50mL	1 袋	点滴静注	側管②-4	15分	●							
		デキサート注射液3.3mg1mL	3 管											
14		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管②-5	15分	●							
						プロイメンド投与後の時間待ち								
15		大塚生食注500mL	1 袋	【化療混注】	側管②-6	2時間	●							
	癌	ランダ注10mg 20mL	80 mg/m2	点滴静注										
	癌	ランダ注50mg 100mL		全量500mLに調製										
16		ラクテック注1L	1 袋	点滴静注	側管②-7	250mL/h	●							
17		マンニトールS注射液 300mL	1 瓶	点滴静注	側管②-8	150mL/h	●							
18		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管②	15分		●	●	●	●			
		デキサート注射液3.3mg1mL	2 管											
19		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	側管①	全開にてフラッシュ						●		
						day6								
20		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	プライミングして残破棄							●	
21		大塚生食注100mL	1 瓶	【化療混注】	メイン	30分							●	
	癌	オブジーボ点滴静注240mg	240 mg/body	点滴静注										
				インラインフィルター使用										
22		生理食塩液「ヒカリ」50mL	1 瓶	点滴静注	メイン	全開にてフラッシュ							●	