

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

|        |   |
|--------|---|
| レジメン名  | ディールデー<br>血液癌DLd第1,2クール【皮下ダラキューロ】(ポート以外)      ポート以外 |
| 対象疾患   | 多発性骨髄腫(再発又は難治性の場合に限る)                               |
| 1コース日数 | 28日   |
| 対象患者区分 | ■ 外来                      ■ 入院                      |

| Rp. | 癌 | 薬品名           | 投与量                                      | day 1 | day2 | day 8 | day 9 | day15 | day16 | day21 | day 22 | day 23 | day 28 |
|-----|---|---------------|--|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1   |   | カロナール錠500mg   | 2錠                                       | ●     |      | ●     |       | ●     |       |       | ●      |        |        |
|     |   | レスタミンコーワ錠10mg | 3錠                                       | ●     |      | ●     |       | ●     |       |       | ●      |        |        |
|     |   |               | ダラキューロ投与開始1-3時間前(ダラキューロ投与日の朝食後)          |       |      |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 2   | 癌 | レブラミドカプセル5mg  | 1回5C <b>Ccr30-60では10mg</b>               | ●     | →    | →     | →     | →     | →     | ●     |        |        |        |
|     |   |               | 1日1回夕食後                                  |       |      |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 3   |   | デカドロン錠4mg     | 1回5錠                                     | ●     |      | ●     |       | ●     |       |       | ●      |        |        |
|     |   |               | 1日1回朝食後(ダラキューロ投与開始1-3時間前(ダラキューロ投与日の朝食後)) |       |      |       |       |       |       |       |        |        |        |

| Rp. | 癌 | 薬品名         | 投与量 | 手技        | 投与ルート | 点滴時間 | day1 | day8 | day 15 | day22 | day28 |
|-----|---|-------------|-----|-----------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|
| 1   | 癌 | ダラキューロ配合皮下注 | 1 瓶 | 皮下注       | 皮下    | 5分   | ●    | ●    | ●      | ●     |       |
|     |   |             |     | シリンジで払い出し |       |      |      |      |        |       |       |

- DLdのDはダラキューロの一般名のdaratumumab(ダラツムマブ)のD、Lはレブラミドの一般名のレナリドミド(lenalidomide)のL、dはデキササートもしくはレナデックスの一般名dexamethasone(デキサメサゾン)のd
- 当院は高齢者が多いため、DEXIは20mg/週でレジメン作成