

がん化学療法レジメン

[目次に戻る](#)

レジメン名	ディールディール 血液癌DLd第7クール以降【皮下ダラキューロ】(ポート以外) ポート以外
対象疾患	多発性骨髄腫(再発又は難治性の場合に限る)
1コース日数	28日
対象患者区分	■ 外来 ■ 入院

Rp.	癌	薬品名	投与量	day 1	day2	day 8	day 9	day15	day16	day21	day 22	day 23	day 28
1		カロナール錠500mg	2錠	●									
		レスタミンコーワ錠10mg	3錠	●									
			ダラキューロ投与開始1-3時間前(ダラキューロ投与日の朝食後)										
2	癌	レブラミドカプセル5mg	1回5C Cr30-60では10mg	●	→	→	→	→	→	●			
			1日1回夕食後										
3		デカドロン錠4mg	1回5錠	●		●		●			●		
			1日1回朝食後(ダラキューロ投与開始1-3時間前(ダラキューロ投与日の朝食後))										

Rp.	癌	薬品名	投与量	手技	投与ルート	点滴時間	day1	day8	day 15	day22	day28
1	癌	ダラキューロ配合皮下注	1 瓶	皮下注	皮下	5分	●				
				シリンジで払い出し							

- DLdのDはダラキューロの一般名のdaratumumab(ダラツムマブ)のD、Lはレブラミドの一般名のレナリドミド(lenalidomide)のL、dはデキササートもしくはレナデックスの一般名dexamethasone(デキサメサゾン)のd
- 当院は高齢者が多いため、DEXは20mg/週でレジメン作成
- ダラキューロがない日のDEX服用は朝食後服用